

AVISOS AGRÍCOLAS

Estação do Norte Transmontano

Circular nº: 8/2013

Chaves, 18 de Junho de 2013

VINHA

OÍDIO

O estado do tempo dos últimos dias tem sido muito favorável ao desenvolvimento desta doença.

Encontrando-se as vinhas com grande desenvolvimento vegetativo e num estado muito sensível ao oídio, aconselhamos a manter a sua vinha protegida, utilizando um dos seguintes fungicidas penetrantes:

- azoxistrobina (QUADRIIS)
- cresoxime-metilo (STROBY WG)
- metrafenoma (VIVANDO)
- proquinazida (TALENDO)
- quinoxifena (ARIUS, VENTO 25 SC)
- trifloxistrobina (FLINT)

Se a vinha apresentar já infecções, deverá utilizar enxofre pó. Procure não fazer este tratamento com temperaturas elevadas (acima dos 32º C) e a planta molhada (chuva ou orvalho) para evitar riscos de fitotoxidade – “queima”.

Tenha particular atenção à correcta orientação da vegetação e faça uma criteriosa despampa, de maneira a permitir um bom arejamento da planta.

MÍLDIO

Deve ser feito um tratamento contra esta doença, pois foram criadas condições favoráveis ao aparecimento de novas infecções de míldio.

Utilize um produto penetrante da lista anexa à Circular nº 6.

BATATA

MÍLDIO

Deve procurar manter o seu batatal protegido contra o míldio, visto as condições meteorológicas serem favoráveis ao desenvolvimento desta doença.

(consulte a lista de produtos anexa à Circular anterior)

SOUTO

Poda

Cancro americano - *cryphonectria parasitica*

Para evitar de fazer cortes de pernas mais grossas e a consequente abertura de grandes lesões, efectue nesta altura a poda de ramos de pequeno diâmetro, pois facilita a cicatrização e reduz as possibilidades de infecção do castanheiro por este fungo.

Execute esta tarefa de acordo com os cuidados descritos na Circular nº 2.

O responsável pela Estação de Avisos



Luís Sá
Técnico superior