

Estação do Norte Transmontano

Circular n.º:
13/2014

Chaves, 19 de Novembro de 2014

Castanheiro

-Septoriose do castanheiro

mycosphaerella maculiformis

As anormais condições meteorológicas que se fizeram sentir durante todo o ciclo cultural do castanheiro, provocaram fortes ataques deste fungo nos castanheiros da região, originando uma intensa e prematura queda das folhas e aborto dos frutos.



Foram particularmente afectados os soutos localizados em zonas temperadas e de altitude mais elevada, originando enorme quantidade de inóculo (quantidade de fungo que passa o Inverno nas folhas, potenciando prováveis infecções na próxima Primavera).

Devido à inexistência de produtos homologados para combater o fungo e, havendo-os, à dificuldade na execução e

custo dos tratamentos fitossanitários, as medidas de controlo da doença a tomar são necessariamente de carácter preventivo.

Por isso, e para reduzir a quantidade de inóculo, aconselhamos a **recolha e queima de todas as folhas caídas no solo.**

Pode também destruir as folhas com a pulverização de **ureia diluída em água a 10%** (10 kg de ureia em 100 litros de água).



Para que estas medidas se tornem eficazes, era conveniente alargar a sua aplicação a grandes extensões.

O responsável pela Estação de Avisos



Luís Sá
Técnico Superior